

Yleistä Josilac -tuotteista:

- Suositeltu veden lämpötila laimennoksiin on 18 - 30 °C. Laimennos on käyttövalmis heti ja se tulee käyttää 48h kuluessa valmistuksesta.
- Säilytys ja avaamattoman pakkauksen vähimmäissäilyvyys: Huoneenlämmössä (20 °C): 6 kk. Jääkaapissa (4 - 8 °C): 12 kk. Pakastimessa (-18 °C): 24 kk.
- Pidä sillo suljettuna 6 – 8 viikkoa ennen syöttöä



Josilac® ferm

Ehkäisee hiivojen ja homeiden kasvua ja suojaaa siten rehua jälkilämpenemiseltä

Tuoteominaisuudet

- Heterofermentatiivisia maitohappobakteereja
- Auman ja siilon pintaosien käsittelyyn jälkilämpenemistä, hometta ja hiivoja vastaan, säilöheinälle, maissi- ja kokoviljasäilörehulle sekä murskeviljan säilöntään
- Suositeltu säilöttävän rehun ka-pitoisuus 30 - 60 %
- Yhdellä pussilla säilöä 50 tonnia rehua
- DLG-sertifikaatti jälkilämpenemisen ehkäisystä

Tuotteen sisältämät bakteerit

- Mikrobien määrä $5,0 \times 10^{10}$ PMY/g tuotetta
- Lactobacillus buchneri DSM 22501 (1k20738)



Rehusopivuus

Nurmi >30 %	Maissisäilörehu	Palkokasvit	Kokoviljasäilörehu	Säilöheinä	Murskevilja
•	...	...	..	..	..

